



ASSOCIATION
DENTAIRE
FRANÇAISE

Procédure

D'HABILLAGE

1 HYGIÈNE DES MAINS



Se laver les mains à l'eau et au savon
ou se frictionner les mains avec une
solution hydroalcoolique.

2 PROTECTION DE LA TENUE PROFESSIONNELLE

SURBLOUSE



- Enfiler la surblouse
- La surblouse doit recouvrir :
 - le torse du cou aux genoux,
 - les bras et avant-bras jusqu'aux poignets.
- Attacher au niveau du cou et de la taille.

TABLIER PLASTIQUE À USAGE UNIQUE*



- Mettre en place le tablier
plastique.
- Le remonter au maximum pour
couvrir le torse.
- Attacher au niveau de la taille.

* Alternative en cas de pénurie de surblouse



ASSOCIATION
DENTAIRE
FRANÇAISE

Procédure

D'HABILLAGE

3 MASQUE FFP2



Placer le masque et bien l'emboîter sous le menton.




Serrer la barrette nasale.



Contrôler l'étanchéité (Fit check) du masque.


4 PROTECTION OCULAIRE

LUNETTES DE PROTECTION



Mettre les lunettes de protection professionnelle et les ajuster.

ECRAN FACIAL



Mettre l'écran facial et s'assurer qu'il couvre bien sur les côtés.



ASSOCIATION
DENTAIRE
FRANÇAISE

Procédure

D'HABILLAGE

5 CHARLOTTE OU CALOT



Mettre en place une charlotte
ou un calot.

6 HYGIÈNE DES MAINS



Se frictionner les mains avec
une solution hydroalcoolique.




ASSOCIATION
DENTAIRE
FRANÇAISE

Procédure

D'HABILLAGE

7 PROTECTION DES MEMBRES SUPÉRIEURS EN CAS D'UTILISATION DU TABLIER

S'ÉQUIPER DE MANCHONS PROTECTEURS



Pour avoir plus de sensations tactiles, découper les extrémités des doigts.




Tirer sur la partie haute du gant pour créer une zone de rétention.




Enfiler les protections.

8 GANTS



Mettre les gants par-dessus la surblouse ou les protections des membres supérieurs (si utilisés).



RECOMMANDATIONS

- Garder les mains loin du visage.
- Limiter les surfaces touchées.
- Tout équipement de protection individuel à usage unique doit être changé entre chaque patient (hormis le masque s'il est non souillé, non mouillé).



ASSOCIATION
DENTAIRE
FRANÇAISE


Procédure

DÉSHABILLAGE

**Cette étape est à risque
de contamination et elle nécessite donc
d'être particulièrement vigilant.**

1 PROTECTION DE LA TENUE

SURBLOUSE




- Retirer la surblouse (sans toucher la tenue en-dessous).
- La rouler sur elle-même afin que la partie contaminée soit non exposée.
- Emmener les gants en retirant la surblouse, sinon retirer les gants après.

TABLIER PLASTIQUE



Retirer le tablier en le tirant vers l'avant, puis retirer les gants.

MANCHONS



Retirer les protections des membres supérieurs et les gants à usage unique.

2 PREMIÈRE HYGIÈNE DES MAINS



Se frictionner les mains avec une solution hydroalcoolique.



Se frictionner également les avant-bras si les soins n'ont pas nécessité l'utilisation de protections spécifiques.



ASSOCIATION
DENTAIRE
FRANÇAISE

Procédure

DÉSHABILLAGE

3 PROTECTIONS OCULAIRES


Retirer l'écran facial et/ou les lunettes de protection.



Entre deux patients, s'arrêter à ce stade.

4 CHARLOTTE

Retirer la charlotte par l'arrière.



5 MASQUE FFP2

Retirer le masque par l'arrière, par les élastiques.



6 DEUXIÈME HYGIÈNE DES MAINS

Se frictionner les mains pendant 30 secondes avec une solution hydroalcoolique.



RECOMMANDATIONS

- Les EPI souillés sont évacués par la filière DASRI.
- Désinfecter les lunettes et l'écran facial (friction avec solution hydroalcoolique après la désinfection).